

BILAG I
PRODUKTRESUME

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, Injektionsvæske til katte

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pr. dosis á 1 ml (engangssprøjte).

Aktive stoffer	Relativ potens (R.P.)
Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4)	9,50 – 12,25
Inaktiveret felint calicivirus (stamme 255)	1,65 – 2,15
Inaktiveret felint rhinotracheitisvirus (stamme 605)	1,60 – 2,10
Inaktiveret felint <i>Chlamydia psittaci</i> (Cello-stamme)	2,00 – 2,30
Inaktiveret felint leukæmivirus (stamme 61E)	1,45 – 2,0
Adjuvanter	
Ethylen/Ethylenmaleinsyre-anhydrid (EMA)	10 mg
Neocryl XK-62	30 mg
Emulsigen SA	50 mg

Se en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer i afsnit 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kat

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af raske katte, der er 9 uger eller derover, mod felin panleukopeni og felin leukæmi og mod luftvejsinfektioner, der er forårsaget af felint rhinotracheitisvirus, felint calicivirus og felint *Chlamydia psittaci*.

4.3 Kontraindikationer

Ingen.

4.4 Særlige advarsler

Vaccination påvirker ikke forløbet af FeLV-infektion hos katte, som allerede er inficerede med FeLV på vaccinationstidspunktet, hvilket indebærer, at disse katte vil udskille FeLV, uanset at de er vaccinerede; som følge heraf vil disse dyr udgøre en risiko for modtagelige katte i deres omgivelser.

Det anbefales derfor, at katte med en betydelig risiko for at have været udsat for FeLV, testes for FeLV-antigen før vaccination. Test-negative dyr kan vaccineres, mens test-positive dyr bør isoleres fra andre katte og testes igen inden for 1-2 måneder. Katte, som er positive ved den anden test, må anses for at være permanent inficerede med FeLV, og de bør behandles i overensstemmelse hermed. Katte, som er negative ved den anden testning, kan vaccineres, da de efter al sandsynlighed er kommet sig oven på FeLV-infektionen.

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion, gives adrenalin intramuskulært.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Til brugeren:

Dette produkt indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående.

Hvis De ved et uheld injiceres med dette produkt, skal De søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde. Tag indlægssedlen med Dem.

Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal De søge lægehjælp igen.

Til lægen:

Dette produkt indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingerblødder eller sener.

4.6 Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

I sjældne tilfælde kan vaccinerede katte udvikle reaktioner efter vaccinationen så som forbigående feber, opkastning, manglende appetit og/eller depression. Disse forsvinder sædvanligvis inden for 24 timer.

Der kan af og til ses en lokalreaktion på injektionsstedet med hævelse, smerte, kløe eller hårtab.

I meget sjældne tilfælde er der set en anafylaktisk reaktion inden for de første timer efter vaccinationen, med ødem, kløe, hjerte- og respiratorisk forstyrrelse, alvorlige problemer med mave-tarmkanal eller chok. Se afsnit 5.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen) for vejledning til behandling.

4.7 Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Vaccinens sikkerhed hos drægtige hunkatte er ikke undersøgt. Vaccination af drægtige hunkatte frarådes.

4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler. Det frarådes derfor at anvende andre vacciner inden for 14 dage inden eller efter vaccinationen med dette lægemiddel.

4.9 Dosering og indgivelsesvej

Engangssprøjtens indhold bør rystes godt og indgives aseptisk ved subkutan injektion. Når lægemidlet skal administreres, bør man være omhyggelig med at sætte den medfølgende sterile kanyler aseptisk fast på sprøjten før brug.

Basisvaccination af katte, der er 9 uger og ældre; to doser med 3-4 ugers interval. En ekstra dosis anbefales til killinger, der lever i miljøer med høj FeLV-risiko, hvor den første dosis blev givet før 12 ugers alderen.

Revaccination: 1 årlig vaccination.

4.10 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Der er ikke set andre bivirkninger end dem, der er nævnt i afsnittet "Bivirkninger".

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5. IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

ATC VET kode: QI06AL01

Fevaxyn Pentofel stimulerer udviklingen af aktiv immunitet mod felint panleukopenivirus, felint rhinotracheitisvirus, felint calicivirus, felint *Chlamydia psittaci* og felint leukæmivirus hos vaccinerede dyr.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer

Eagles Earles Minimal Essential Medium med HEPES buffer og lactalbumin hydrolysat.

6.2 Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

1 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

6.5 Den indre emballagens art og indhold

3 ml engangssprøjter af polypropylen, der indeholder 1 ml vaccine. Sprøjterne er forseglet med gummilukkere.

Pakning:

En karton, der indeholder 10, 20 eller 25 præfyldte engangssprøjter à 1 ml dosis med henholdsvis 10, 20 eller 25 sterile kanyler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

7. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Irland

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/96/002/001-003

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Første tilladelse: 5. februar, 1997.

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) <http://www.emea.europa.eu/>.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

BILAG II

- A. FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE**
- B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, HERUNDER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG**
- C. FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG**
- D. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER**

A. FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af de(t) biologisk aktive stof(fer)

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo
Irland

Fort Dodge Charles City
2000 Rockford Road
Charles City
Iowa 50616
USA

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo
Irland

B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, HERUNDER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE SALG, UDLEVERING OG BRUG

Ikke relevant

D. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

BILAG III
ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETERING

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

10 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter.
20 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter.
25 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter.

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, Injektionsvæske til katte

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Inaktiveret vaccine til katte med adjuvans

Pr. dosis á 1 ml.

Inaktiveret FPV (9,50 – 12,25); FCV (1,65 – 2,15); FVR (1,60 – 2,10); FCP (2,00 – 2,30);
FeLV (1,45 - 2,0)

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske.

4. PAKNINGSTØRRELSE

10 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter med 10 stk. sterile kanyler.
20 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter med 20 stk. sterile kanyler.
25 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter med 25 stk. sterile kanyler.

5. DYREARTER

Kat

6. INDIKATION(ER)

Til aktiv immunisering af raske katte, der er 9 uger eller derover, mod felin panleukopeni og felin leukæmi, og mod luftvejsinfektioner, der er forårsaget af felint rhinotracheitisvirus, felint calicivirus og felint *Chlamydia psittaci*.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej(E)

Injektionsvæske.
Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: Ikke relevant.

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Utilsigtet injektion er farlig – læs indlægsseddel inden brug.

10. UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres i køleskab (2°C - 8°C).
Må ikke nedfryses.
Sprøjterne bør bevares i den ydre karton for at beskytte dem mod lys.

**12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE**

Læs indlægssedlen for informationer over for bortskaffelse.

**13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR
UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT**

Kun til dyr.
Må kun udleveres efter veterinærrecept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Irland

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

10 x 1 ml dosis EU/2/96/002/001
20 x 1 ml dosis EU/2/96/002/002
25 x 1 ml dosis EU/2/96/002/003

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1 ml (1 dosis)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, Injektionsvæske til katte

2. MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Inaktiveret FPV, FCV, FVR, FCP, FeLV

3. PAKNINGSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

Inaktiveret vaccine 1 ml (1 dosis) til katte.

4. INDGIVELSESVÆJ(E)

Injiceres subkutan.

5. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: Ikke relevant.

6. BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

7. UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL
Fevaxyn Pentofel, Injektionsvæske til katte

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo
Irland

Fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo
Irland

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, Injektionsvæske til katte

3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Pr. dosis á 1 ml (engangssprøjte).

Aktive stoffer	Relativ potens (R.P.)
Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4)	9,50 – 12,25
Inaktiveret felint calicivirus (stamme 255)	1,65 – 2,15
Inaktiveret felint rhinotracheitisvirus (stamme 605)	1,60 – 2,10
Inaktiveret felint <i>Chlamydia psittaci</i> (Cello-stamme)	2,00 – 2,30
Inaktiveret felint leukæmivirus (stamme 61E)	1,45 – 2,0
Adjuvanter	
Ethylen/Ethylenmaleinsyre-anhydrid (EMA)	10 mg
Neocryl XK-62	30 mg
Emulsigen SA	50 mg

4. INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af raske katte, der er 9 uger eller derover, mod felin panleukopeni og felin leukæmi, og mod luftvejsinfektioner forårsaget af felint rhinotracheitisvirus, felint calicivirus og felint *Chlamydia psittaci*.

5. KONTRAINDIKATIONER

Vaccinens sikkerhed hos drægtige hunkatte er ikke undersøgt. Vaccination af drægtige hunkatte anbefales ikke.

6. BIVIRKNINGER

I sjældne tilfælde kan vaccinerede katte udvikle reaktioner efter vaccinationen så som forbigående feber, opkastning, manglende appetit og/eller depression. Disse forsvinder sædvanligvis inden for 24 timer.

Der kan af og til ses en lokalreaktion på injektionsstedet med hævelse, smerte, kløe eller hårtab.

I meget sjældne tilfælde er der set en anafylaktisk reaktion inden for de første timer efter vaccinationen, med ødem, kløe, hjerte- og respiratorisk forstyrrelse, alvorlige problemer med mave-tarmkanal eller chok. Se afsnit 5.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen) for vejledning til behandling.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7. DYREARTER

Kat

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ(E)

1 ml til subkutan brug.

Engangsprøjtens indhold bør rystes godt og indgives aseptisk ved subkutan injektion. Når lægemidlet skal administreres, bør man være omhyggelig med at sætte den medfølgende sterile kanyle aseptisk fast på sprøjten før brug.

Basisvaccination af katte, der er 9 uger og ældre; to doser med 3-4 ugers interval. En ekstra dosis anbefales til killinger, der lever i miljøer med høj FeLV risiko, hvor den første dosis blev givet før 12 ugers alderen.

Revaccination: 1 årlig vaccination.

9 OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares og transporteres i køleskab (2°C - 8°C).
Sprøjterne bør bevares i den ydre karton for at beskytte dem mod lys.
Må ikke nedfryses.

12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Vaccination påvirker ikke forløbet af FeLV infektion hos katte, som allerede er inficerede med FeLV på vaccinationstidspunktet, hvilket indebærer, at disse katte vil udskille FeLV, uanset at de er vaccinerede; som følge heraf vil disse dyr udgøre en risiko for modtagelige katte i deres omgivelser. Det anbefales derfor, at katte med en betydelig risiko for at have været udsat for FeLV testes for FeLV-antigen før vaccination. Test-negative dyr kan vaccineres, mens test-positive dyr bør isoleres fra andre katte og testes igen inden for 1-2 måneder. Katte, som er positive ved den anden test, må anses for at være permanent inficerede med FeLV, og de bør behandles i overensstemmelse hermed. Katte, som er negative ved den anden testning, kan vaccineres, da de efter al sandsynlighed er kommet sig oven på FeLV infektionen.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre. Det frarådes derfor at anvende andre vacciner inden for 14 dage inden eller efter vaccinationen med dette lægemiddel.

Indgivelse af en overdosering medfører ingen forværrelse af bivirkningerne.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion, gives adrenalin intramuskulært.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Til brugeren:

Dette produkt indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående.

Hvis De ved et uheld injiceres med dette produkt, skal De søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde. Tag indlægssedlen med Dem.

Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal De søge lægehjælp igen.

Til lægen:

Dette produkt indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingerblødder eller -sener.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGGSSEDLEN

.....

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

15. ANDRE OPLYSNINGER

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

10 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter med 10 stk. sterile kanyler.

20 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter med 20 stk. sterile kanyler.

25 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter med 25 stk. sterile kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

EU/2/96/002/001-003

ATCvet-kode: QI06AL01

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien
Fort Dodge Veterinär GmbH
Duitsland/Allemagne/Deutschland
Tel/Tél: + 32 (0)2 713 1422

Luxemburg/Luxembourg
Fort Dodge Veterinär GmbH
Allemagne/Deutschland
Tel: + 32 2 713 1422

Република България
”СаниКо БЪЛГАРИЯ” ООД
Тел: + 359 28514413

Magyarország
Cymedica Hungary Kft.
Tel.: + 36 305 652 187

Česká republika
Cymedica spol s.r.o.
Tel: + 420 311 545 011

Malta
Fort Dodge Animal Health
The Netherlands
Tel: + 31 35 699 3365

Danmark
ScanVet Animal Health A/S
Tlf: + 45 48 48 43 17

Nederland
Fort Dodge Veterinär GmbH
Duitsland
Tel: + 31 (0)20 346 9360

Deutschland
Fort Dodge Veterinär GmbH
Tel: + 49 (0)2405 454 100

Norge
ScanVet informasjonskontor
Tlf: +47 22 76 72 50

Eesti
Linax Agro Veterinarijos Centras Ltd.
Leedu
Tel: + 370 45 507 400

Österreich
Fort Dodge Veterinär
Tel: + 43 (0)6245 7065316

Ελλάδα
Veterin S.A.
Τηλ: + 30 21 0 55 75 770-3

Polska
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 61 426 49 20

España

Fort Dodge Veterinaria S.A.
Tel: + 34 91 598 1336

Portugal

Fort Dodge Veterinaria S.A.
Espanha
Tel: + 34 91 598 1336

France

Fort Dodge Santé Animale
Tel: + 33 (0)2 47 74 89 89

România

Torox srl
Tel: + 40212509306

Ireland

Fort Dodge Animal Health Limited
UK
Tel: + 44 1489 781 711

Slovenija

Vet4vet d.o.o.
Tel: +386 1 2800672

Ísland

Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Cymedica spol s.r.o.
Česká republika
Tel: + 420 311 545 011

Italia

Fort Dodge Veterinaria S.p.A.
Tel.: + 39 051 421 53 11

Suomi/Finland

ScanVet Eläinlääkkeet Oy/Ab
Puh/Tel: + 358 (0)3 630 3100

Κύπρος

Premier Shukuroglou Ltd.
Τηλ: + 357 22815353

Sverige

Ceva Vetpharma AB
Tel: + 46 (0)46 12 81 00

Latvija

Linās Agro Veterinārijos Centras Ltd.
Lietuva
Tel: + 370 45 507 400

United Kingdom

Fort Dodge Animal Health Limited
Tel: + 44 (0)1489 781 711

Lietuva

Linās Agro Veterinārijos Centras Ltd.
Tel: + 370 45 507 400